

**Дополнения к временному протоколу ведения пациентов
с внебольничной пневмонией с подозрением
на COVID19 и COVID19 +**

Приняты консилиумом от 30.04.2020 в составе: О.Н. Ткачевой, А.С. Мильто,
Ю.В. Котовской, А.В. Наумова, И.Д. Стражеско

Лабораторные исследования и анти тромботическая терапия

1. Д-димер берется всем при поступлении, в дальнейшем - по показания
2. Показания для назначения лечебной дозы низкомолекулярного гепарина (при СКФ <30 мл/мин/1,73 м² - нефракционированного гепарина) при отсутствии абсолютных противопоказаний
 - Уровень Д-димера >1500 нг/мл исходно или в динамике
 - Ухудшение состояния пациента ситуации при отсутствии убедительных данных для введения биологических препаратов
 - Снижение SpO₂ $<93\%$ или отрицательная динамика по КТ при отсутствии высокой лихорадки
 - Лихорадка $>38,0$ С, сатурация не снижается

Препараты и дозы

- **клексан 1 мг/кг массы тела 2 раза в день**
- **при массе тела > 100 кг или СКФ < 30 мл/мин/1,73м² нефракционированный гепарин под контролем АЧТВ (целевое АЧТВ 60-70)**