

**Дополнения к временному протоколу ведения пациентов
с внебольничной пневмонией с подозрением
на COVID19 и COVID19 +**

Приняты консилиумом от 30.04.2020 в составе: О.Н. Ткачевой, А.С. Мильто,
Ю.В. Котовской, А.В. Наумова, И.Д. Стражеско

Рекомендации по анти тромботической терапии при выписке

Группы пациентов	Рекомендации по анти тромботической терапии при выписке
Пациенты, не принимавшие антикоагулянты до госпитализации, с повышением D-димера выше 2 верхних границ нормы в период госпитализации в сочетании с хотя бы одним из следующих факторов: - возраст 60 лет и более - сахарный диабет 2 типа - анамнез сердечно-сосудистого заболевания (инфаркт миокард, сердечная недостаточность, инсульт/транзиторная ишемическая атака, ТЭЛА или тромбоз глубоких вен)	При отсутствии противопоказаний рекомендовать профилактические дозы антикоагулянтов в течение 45 дней после выписки: ривароксабан 10 мг 1 раз в сутки ИЛИ клексан 40 мг 1 раз п/к 1 раз в сутки
Пациенты, принимавшие антикоагулянты до госпитализации	Рекомендовать продолжить прием того же препарата в той же дозе, что и до госпитализации, убедившись, что не возникла ситуация, требующая коррекции дозы и/или отмены препарата
Пациенты, принимавшие анти тромботические препараты до госпитализации	Рекомендовать продолжить прием того же препарата в той же дозе, что и до госпитализации, убедившись, что не возникла ситуация, требующая коррекции дозы и/или отмены препарата