

Клинические рекомендации Недержание мочи

Критерии оценки качества медицинской помощи

№	Критерии качества	УДД*	УУР**
1	Собран анамнез заболевания, про анализированы принимаемые для сопутствующих заболеваний медикаментозные препараты, которые могут приводить к недержанию мочи	5	С
2	Выполнен осмотр пациента, в том числе в гинекологическом кресле (для женщин) с кашлевым тестом	5	С
3	Пациентом заполнен 3-дневный дневник мочеиспусканий, выполнен его анализ.	2	В
4	Выполнен общий анализ мочи	3	С
5	Выполнено УЗИ органов мочевыводящей системы с определением остаточной мочи	2	В
6	При наличии рефрактерного к медикаментозной терапии ургентного недержания мочи или осложненного стрессового недержания мочи, нейрогенного недержания мочи или недержания мочи у мужчин выполнено комплексное уродинамическое исследование	2	В
	Выполнена цистоскопия при гематурии, боли в мочевом пузыре, рецидивном недержании мочи, при подозрении на наличие уrogenитальных свищей и экстрауретрального недержания мочи.	2	В
7	Назначена консервативная поведенческая терапия, в том числе модификация диеты, образа жизни, тренировка мочевого пузыря, а также тренировка мышц тазового дна	1	А
8	Назначена медикаментозная терапия ургентного недержания мочи	1	А
9	При ургентном недержании мочи, рефрактерном к приему медикаментов, или при выраженных побочных эффектах выполнено внутри детрузорное введение ботулинического токсина	1	А
10	Женщинам, страдающим стрессовым НМ выполнить операцию с применением субуретрального слинга, при отсутствии эффекта от консервативной терапии, при наличии показаний и отсутствии противопоказаний	1	А
12	Мужчинам, страдающим стрессовым НМ выполнить операцию с применением субуретрального слинга или искусственного сфинктера уретры, при отсутствии эффекта от консервативной терапии, при наличии показаний и отсутствии противопоказаний	3	В
<p>*УУД – уровень убедительности рекомендаций **УДД - уровень достоверности доказательств</p>			